Toxicités médicamenteuses rétiniennes

Éditorial

S.-Y. COHEN
Centre ophtalmologique d'imagerie et de laser (CIL), PARIS.

J'ai le grand plaisir d'annoncer une nouvelle rubrique, régulière, dans les numéros de *Réalités Ophtalmologiques*. Dans cette rubrique seront présentés des images et un texte court concernant les toxicités médicamenteuses rétiniennes. Cette rubrique est confiée au docteur Charlotte Rohart (CIL et hôpital Cochin, Paris).

Le sujet paraît marginal. Cependant, de nombreuses thérapeutiques courantes peuvent s'accompagner de manifestations au fond d'œil. Ces lésions rétiniennes peuvent donner lieu à des explorations inutiles, voire des traitements agressifs inappropriés.

Les médicaments susceptibles d'entraîner des modifications de la rétine sont de plus en plus prescrits. Certains sont classiques, comme les antipaludéens de synthèse, mais d'autres ne sont connus que depuis quelques années. Ainsi, certaines chimiothérapies réservées initialement à l'usage hospitalier, tels les inhibiteurs de MEK, sont de plus en plus prescrites pour les cancers métastasés. Les antiviraux sont également couramment prescrits aux patients infectés par le virus HIV. Cela donne des modifications d'allure inquiétante au fond d'œil qu'il faut savoir reconnaître pour pouvoir parfois proposer l'arrêt de ces thérapeutiques.

Je remercie le comité éditorial de *Réalités Ophtalmologiques*, et en particulier le docteur Thomas Desmettre, de permettre une large diffusion à ces images et d'améliorer ainsi notre connaissance et notre pratique.